

■ SERIE GUIDE "CHE FARE SE..."

IL CANE E IL MORSO DI VIPERA



IL CANE E I PERICOLI



APACA
ASSOCIAZIONE ODV

Il cane può essere morsicato da una vipera soprattutto alla testa o sul naso o alla zampa, ma non sono rare morsicature anche all'addome o al torace: è un evento grave, che va affrontato tempestivamente e con molta calma.

Se c'è stata inoculazione, dopo alcuni minuti dal morso compare un'ecchimosi e il cane sente un forte dolore: subentrano, quindi, danni al fegato e ai reni e una grave ipotensione, che è la causa di morte più frequente. E' possibile disinfettare la zona con della semplice acqua o dell'acqua ossigenata, ma non con alcool che a contatto con il veleno dà vita a composti tossici.

Non vanno praticate incisioni di alcun tipo, nè va usato un laccio emostatico (al massimo, va praticato il bendaggio linfostatico che si ottiene fasciando l'arto morso con una benda elastica, sempre partendo dall'alto verso il basso) e tantomeno si deve tentare di succhiare via il veleno. Può essere utile portare con sè del cortisone in compresse ma la somministrazione va effettuata solo su autorizzazione del veterinario.

E' fondamentale che il cane sia mantenuto il più fermo possibile al fine di evitare che il veleno entri velocemente in circolo ed è necessario ricorrere entro il più breve tempo possibile alle cure del





veterinario (durante il trasporto è necessario mantenere il punto del morso sotto al livello del cuore) : perciò, se ci si allontana molto dalla propria residenza, è opportuno annotarsi gli indirizzi dei veterinari della zona o ricorrere alla mappa delle strutture veterinarie.

E' bene, comunque, tener presente che il periodo di massima pericolosità del morso di vipera è la primavera, quando le ghiandole velenifere sono piene di veleno, mentre nel corso dell'estate la quantità iniettabile diminuisce.

Non solo, ma nel 20% dei casi il morso è "secco", ossia senza inoculazione di veleno, poichè la vipera tende a non sprecarlo.

Il cane e il morso di vipera



Il cane può essere morsiato da una vipera soprattutto alla testa o sul naso o alla zampa, ma non sono rare morsiature anche all'addome o al torace. La forma del morso è caratteristica: due fori a distanza di 1 cm l'uno dall'altro.

da fare

da non fare



disinfettare la zona del morso con della semplice acqua o dell'acqua ossigenata



utilizzare alcool: interagendo con il veleno dà vita a composti tossici



entro il più breve tempo possibile allertare e raggiungere il veterinario



praticare incisioni: si velocizza l'assorbimento del veleno e si fa agitare ulteriormente il cane



tenere il cane il più fermo possibile evitando che il veleno entri velocemente in circolo



usare un laccio emostatico: si rischia di provocare la necrosi della zampa



se il morso è avvenuto alla testa o al collo, sfilare subito il collare



tentare di succhiare via il veleno: parte del veleno passa a chi sta succhiando



può essere praticato il bendaggio linfostatico ma evitando di comprimere



chiedere al veterinario di venire sul posto: per tentare di salvare il cane serve andare in clinica



trasportare il cane mantenendo il punto del morso sotto al livello del cuore



far camminare il cane: si aumenta la velocità di entrata in circolo del veleno

E' un evento grave, che va affrontato tempestivamente e con molta calma

■ SERIE GUIDE "CHE FARE SE..."

Le guide sono messe a disposizione dall'Associazione APACA per integrare e non sostituire le indicazioni fornite dal veterinario di fiducia o da altri professionisti



APACA
ASSOCIAZIONE ODV

"I cani non mentono su ciò che provano...nessuno ha mai visto un cane triste che fingesse di essere felice."
(Jeffrey Moussaieff Masson, psicoanalista e scrittore statunitense)